

# ACCESS

ACCESS Çalışmasının Sayın Yerel Koordinatörü,

ACCESS projesine katılımınız için teşekkür ederiz.

Bir sonraki sayfada sezaryenin perioperatif döneminde toplanan hasta verilerinin girişini yapabileceksiniz.

Hasta başına bir anketi yanıtlamanıza ihtiyacımız olacak. Tüm alanlar zorunludur.

Haydi başlayalım!

## Vaka Girişi

1 Hangi ülkede çalışıyorsunuz?

---

2 Ülkenizin uluslararası telefon kodu nedir?

---

3 Tıp merkezinizin çalışma numarası nedir?

---

4 Merkezinizden bildirilen kaçınıcı vakadır

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69

- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80

## Hasta Detayları

- 5 Sezaryen ameliyatı olan hastanın yaş grubu nedir? (Yıl)  15-20  
 21-25  
 26-30  
 31-34  
 35-39  
 40-44  
 >44
- 6 Sezaryen ameliyatı olan hastanızın boyu (cm) nedir? \_\_\_\_\_
- 7 Sezaryen ameliyatı olan hastanızın kilosu (kg) nedir? \_\_\_\_\_
- 8 Hastanın tıbbi durumu nedir (Amerikan Anesteziyologlar Derneği (ASA) sınıflandırma durumuna göre?)  1-2 Sağlıklı gebe (genellikle ASA2 olarak sınıflandırılır) veya hafif hastalığı olan gebe  
 3 Orta derecede hastalığı olan gebe  
 4 Şiddetli veya yaşamı tehdit eden hastalığı olan gebe  
 5 Gebe, can çekişiyor, hayatta kalması pek mümkün değil  
Diğer: \_\_\_\_\_
- 9 Bu hastaya anestezi uygulamak/denetlemek için ameliyathanede bulunan en kıdemli anesteziistin deneyim/sertifika düzeyi nedir? (Not - süpervizör odada bulunmayabilir, ancak yardımcı olmak için tamamen hazırdır). Lütfen ülkeniz için en yakın kategoriye kullanın.  Anestezi asistanı < 2 yıl  
 Asistan ≥ 2-5 yıllık deneyim  
 Anestezi (asistan veya uzman) 6-10 yıllık deneyim  
 Anestezi (asistan veya uzman) ≥10 yıl deneyim  
 Obstetrik Anestezi uzmanı  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 10 Sezaryen endikasyonu nedir?  Malprezantasyon  
 Çoğul Gebelik  
 Mükerrer sezaryen  
 Anne isteği  
 Plasenta previa, Plasenta akreta  
 Anne tıbbi durumu  
 İntrapartum sezaryen acil (örn. başarısız doğum denemesi/ uzamış doğum eylemi/başarısız operatif doğum)  
 Fetal distres  
 Kanama  
 Diğer: \_\_\_\_\_

- 11 Sezaryen doğum aciliyetinin sınıflandırması neydi?  Acil / Kod Kırmızı: Doğum 15 dakikadan daha kısa sürede gerekli  
 İvedi / Kod Oranj: Doğum 30-60 dakikadan daha kısa sürede gerekli  
 Hızlandırılmış / Kod Yeşil: Mümkün olan en kısa sürede doğum / > 60 dakika ila 24 saat içinde  
 Elektif
- 12 Sezaryenin başlangıç saati kaçtı?  00:01 - 04:00  
 04:01 - 08:00  
 08:01 - 12:00  
 12:01 - 16:00  
 16:01 - 20:00  
 20:01 - 00:00
- 13 Planlanmamış sezaryen durumunda, sezaryen kararından fetal göbek kordonunun klemlenmesine kadar geçen süre (karardan doğuma kadar geçen süre, DDI) ne kadar sürdü? (dakika) Lütfen olabildiğince doğru olun.  Not Applicable  
 Other: \_\_\_\_\_
- 14 Hastayla ilgilenen ilk anesteziistin başlangıç anestezi planı neydi? (Daha sonra başka bir ikincil plan kullanmış olsanız bile)  Spinal anestezi  
 Epidural anestezi  
 Kombine spinal epidural  
 Ağrısız doğum için takılan epidural kateterden topup (takviye) doz uygulanması  
 Devamlı spinal anestezi  
 Genel anestezi  
 Diğer \_\_\_\_\_
- 15 İntrapartum Sezaryen: Doğum analjezisi için takılmış epidural kateteri var mı?  Evet  
 Hayır  
 Uygulanamaz
- 16 İntrapartum Sezaryen: Doğum analjezisi için takılmış epidural kateteri olması durumunda, başlangıç anestezi planını uygulayan anestezi kateterini iyi / yeterli doğum analjezisi sağladığını düşündü mü?  Uygulanamaz  
 Evet  
 Hayır
- 17 İntrapartum Sezaryen: Ağrısız doğum için takılmış epidural kateter anestezi için kullanılmaya karar verildiyse, top up (takviye) ilaçlarını nerede vermeye başladınız?  Uygulanamaz  
 Doğumhanede  
 Ameliyathaneye giderken  
 Ameliyathanede  
 Diğer: \_\_\_\_\_

**Nöralaksiyel anestezi kullanılmışsa (Ağrısız doğum için takılan epidural kateterden top up (takviye) doz uygulanması / Yeni epidural/ yeni spinal anestezi/ kombine spinal-epidural anestezi), lütfen uygulanan lokal anestetik ve adjuvanlar ve dozları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız:**

- 18 Spinal Lokal Anestetik Ajan. İlaç doz/hacim ayrıntılarını "Diğer" bölümüne ekleyebilirsiniz.  Spinal doz yok / uygulanamaz  
 Hiperbarik Bupivakain %0.5  
 İzobarik Bupivakain %0.5  
 Levobupivakain %0.5  
 Klorprokain %3  
 Prilokain %2  
 Diğer: \_\_\_\_\_

- 19 Spinal lipofilik opioid. İlaç doz/hacim ayrıntılarını "Diğer" bölümüne ekleyebilirsiniz.
- Spinal lipofilik opioid yok / uygulanamaz  
 Fentanil  
 Sufentanil  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 20 Spinal uzun etki süreli opioid. İlaç doz/hacim ayrıntılarını "Diğer" bölümüne ekleyebilirsiniz.
- Spinal uzun-süreli opioid yok /Uygulanamaz  
 Morfin  
 Diamorfin  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 21 Spinal opioid olmayan Adjuvanlar? (Çeşitli seçenekler mümkündür)
- Spinal opioid olmayan adjuvan /Uygulanamaz  
 Klonidin  
 Deksmetomidin  
 Epinefrin  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 22 Epidural Tamamlama (Top Up): Lokal Anestezik İlaç doz/hacim ayrıntılarını "Diğer" bölümüne ekleyebilirsiniz. Adjuvanların daha sonraki bir soruda sorulduğuna lütfen dikkat edin.
- Epidural takviyesi yok / Uygulanamaz  
 Ropivakain %0.75  
 Ropivakain %0.5  
 Levobupivakain %0.5  
 Levobupivakain %0.375  
 Bupivakain %0.5  
 Bupivakain %0.375  
 Lidokain %2  
 Klorprokain %3  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 23 Epidural Tamamlama (Top Up): Epidural lipofilik opioid. İlaç doz/hacim bilgilerini "Diğer" bölümüne ekleyebilirsiniz.
- Epidural lipofilik opioid yok / Uygulanamaz  
 Fentanil  
 Sufentanil  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 24 Epidural Tamamlama (Top Up): Epidural Uzun Etki Süreli Opioid. İlaç doz/hacim ayrıntılarını "Diğer" bölümüne ekleyebilirsiniz.
- Uzun etkili opioid yok / Uygulanamaz  
 Diamorfin  
 Morfin  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 25 Epidural Tamamlama (Top Up): Opioid olmayan adjuvanlar (Çeşitli seçenekler mümkündür).
- Epidural opioid olmayan adjuvan yok /Uygulanamaz  
 Epinefrin  
 Bikarbonat  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 26 Spinal / Epidural tamamlama (Top Up): Opioid olmayan adjuvanlar, Yorumlar: \_\_\_\_\_
- 
- 27 Nöroaksiyel anestezi (spinal/ ağrısız doğum için takılan epidural kateterden topup (takviye) doz uygulanması / kombine spinal-epidural) kullanıldıysa, insizyondan önce blok nasıl test edildi? Uygun olanların hepsini işaretleyiniz.
- Test edilmedi  
 Anestezi uzmanı tarafından hafif dokunma testi  
 Anestezi uzmanı tarafından Pin-Prick testi  
 Anestezi uzmanı tarafından yapılan soğuk test  
 Anestezi uzmanı tarafından Motor Blok testi  
 Cerrah tarafından cilt testi  
 Diğer: \_\_\_\_\_

- 28 Blok test edildiyse, bloğun ulaştığı en yüksek dermatom seviyesi neydi? (herhangi bir test yöntemi)
- Test edilmedi  
 T1 veya üstü  
 T2  
 T3  
 T4  
 T5  
 T6  
 T7  
 T8  
 T9  
 T10 veya aşağısı  
 Uygulanamaz
- 
- 29 Nöroksiyel anestezi kullanıldıysa (spinal / ağrısız doğum için takılan epidural kateterden topup (takviye) doz uygulanması, / kombine spinal-epidural), Sezaryen doğumda blok başarısız (nöroksiyel anestezi tekrarlanma ihtiyacı, genel anesteziye geçiş) oldu mu?
- Hayır  
 Evet  
 Uygulanamaz
- 
- 30 Evet ise, lütfen nöroksiyel anestezi başarısızlığının tipini belirtiniz (Çeşitli tipler seçilebilir).
- Nöroksiyel Anestezi Başarısızlığı Yok / Uygulanamaz  
 Bloğun tamamen başarısız olması  
 Blok seviyesinin düşük olması  
 Bloğun lateralize olması  
 Blok seviyesi yeterli ancak bloğun yoğunluğu yetersiz  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 31 Nöroksiyel anestezi başarısızlığı olduysa (spinal/ağrısız doğum için takılan epidural kateterden topup (takviye) doz uygulanması / kombine spinal-epidural) aşağıdaki "sonraki plan" stratejilerinden hangisi ilk seçenek olarak kullanıldı?
- Nöroksiyel Anaestezi Başarısızlığı yok/Uygulanamaz  
 Genel Anestezi  
 Olağan dozda lokal anestezi ile Spinal Anestezi  
 Rutin uygulamaya göre azaltılmış dozda lokal anestezi ile Spinal Anestezi  
 Epidural tamamlama (top up) tekrarı  
 Kombine Spinal-Epidural Anestezi  
 İntravenöz / İnhalasyon takviyesi (netleştirme - genel anestezi DEĞİL)  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 32 Nöroksiyel anestezi başarısızlığı olduysa(spinal/ ağrısız doğum için takılan epidural kateterden topup (takviye) doz uygulanması /kombine spinal-epidural) aşağıdaki "sonraki plan" stratejilerinden hangisi ikinci seçenek olarak kullanıldı?
- İkinci plan kullanılmadı/Uygulanamaz  
 Genel Anestezi  
 Olağan dozda lokal anestezi ile Spinal anestezi  
 Rutin uygulamaya göre azaltılmış dozda lokal anestezi ile Spinal Anestezi  
 Epidural tamamlama (top up) tekrarı  
 Kombine Spinal-Epidural Anestezi Int  
 İntravenöz / İnhalasyon takviyesi  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 33 Nöroksiyel anestezi başarısızlığı olduysa (spinal/ ağrısız doğum için takılan epidural kateterden topup (takviye) doz uygulanması /kombine spinal-epidural) aşağıdaki "sonraki plan" stratejilerinden hangisi üçüncü seçenek olarak kullanıldı?
- Üçüncü plan kullanılmadı / Uygulanamaz  
 Genel Anestezi  
 Spinal Anestezi  
 Epidural tamamlama (top up) tekrarı  
 Kombine Spinal-Epidural Anestezi  
 İntravenöz / İnhalasyon Takviyesi  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 34 Başarısız nöroksiyel blok stratejisi, yorumlar (İsteğe bağlı):
- \_\_\_\_\_

- 
- 35 Nöralksiyel anestezi başarısız olduysa, bir sonraki plan (genel anestezi/tekrar blok/intravenöz/inhalasyon takviyesi) ne zaman başlatıldı?
- Nöralksiyel anestezi başarısızlığı yok / uygulanamaz  
 İnsizyon öncesi  
 İnsizyondan sonra doğumdan önce  
 İnsizyondan sonra doğumdan sonra
- 
- 36 Sezaryen sırasında herhangi bir zamanda genel anestezi (invaziv hava yolu desteği dahil) uygulandıysa, nedeni neydi ?
- Nöralksiyel anestezi için annede kontrendikasyon  
 Anne isteği  
 Tamamen başarısız nöralksiyel anestezi  
 Kısmen başarısız nöralksiyel anestezi  
 İyi işleyen bir blokta yetersiz seviye ile zaman eksikliği  
 İyi işleyen bir blok ancak hastanın GA'ye dönüşüm tercihi  
 Hemodinamik instabilitenin klinik yönetimini desteklemek için  
 Uygulanamaz  
 Diğer: \_\_\_\_\_
- 
- 37 Nöralksiyel anesteziye ek olarak intravenöz / inhalasyon ilaçları verildiyse, lütfen kullanılanların hepsini işaretleyin.
- İntravenöz / inhalasyon ilaçları yok  
 Propofol  
 Ketamin  
 Midazolam  
 Etomidat  
 Fentanil / Alfentanil / Sufentanil / Remifentanil  
 Morfin  
 Nitröz Oksid  
 Sevofluran  
 Diğer: \_\_\_\_\_